

## LÆGENS TJEKLISTE I FORBINDELSE MED ORDINATION

Mysimba er indiceret som et supplement til en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet til regulering af vægt hos voksne patienter (>18 år) med en indledende BMI (Body Mass Index) på

- >30 kg/m<sup>2</sup> eller mere (svær overvægt), eller
- >27 kg/m<sup>2</sup> til <30 kg/m<sup>2</sup> (overvægt) sammen med en eller flere vægt-relaterede komorbiditeter (fx. type 2 diabetes, dyslipidæmi, eller kontrolleret hypertension).

Behandling med Mysimba bør afbrydes efter 16 uger, hvis patienterne ikke har tabt mindst 5 % af deres oprindelige kropsvægt (se pkt. 5.1 i det godkendte produktresumé).



### Patientoplysninger

Mand  Kvinde  *Graviditet skal udelukkes, da NB ikke må tages under graviditet eller amning*

Alder (år)  Vægt (kg)  Højde (m)  BMI (kg/m<sup>2</sup>)

Hypertension  Hyperkolesterolæmi  Andre risikofaktorer for kronisk hjertesygdom

Rygning  Lavt HDL-kolesterol

Diabetes  Hypertriglyceridæmi  Aktuelt BT (mm Hg)

### Har patienten:

	Nej	Ja
Ukontrolleret hypertension?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuelle krampeanfald, krampeanfald i anamnesen eller kendt CNS-tumor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuel eller tidligere diagnose med bulimi eller anoreksi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuel afhængighed af kroniske opioider eller opioidagonister?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igangværende, akut behandling for afvænning fra alkohol, benzodiazepin eller opioider?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktuel behandling med bupropion eller naltrexon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bipolar lidelse i anamnesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behandling med MAO-hæmmer de seneste 14 dage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svært nedsat lever- eller nyrefunktion eller nyresvigt i terminalfasen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Kontraindikationer**  
**MÅ IKKE ORDINERES**

### Har patienten:

	Nej	Ja
Moderat nyreinsufficiens? <i>(I tilfælde af diabetes eller ældre patient med nyreinsufficiens skal det overvejes at tage eGFR, inden behandling med NB indledes)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Let eller moderat nedsat leverfunktion?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrolleret hypertension?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Angina pectoris eller nyligt myokardieinfarkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mani i anamnesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selvmodstanker eller tidligere selvmordsforsøg (især hos unge)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depression?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risikofaktorer for krampeanfald (f.eks. hovedtraume i anamnesen, episoder med hypoglykæmi pga. diabetesbehandling, samtidig medicin der kan sænke anfaldstærsklen for kramper, f.eks. antipsykotika, antidepressiva, malariamedicin, tramadol, theofyllin, systemiske steroider, quinoloner eller sløvende antihistaminer)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Patienter med en eller flere af disse risikofaktorer er i øget risiko for at få bivirkninger. Behandling bør kun indledes eller vedligeholdes efter en fuld evaluering af de mulige fordele og risici samt en gennemgang af pkt. 4.4 i produktresuméet.**

### Behandling med Mysimba?

Ja  Nej

Dato  dd/mm/åååå

*Behandlingen seponeres, hvis der er uvished om sikkerheden eller tolerabiliteten ved fortsat behandling*

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8 i det godkendte produktresumé, hvordan bivirkninger indberettes.